

**Programme de vaccination et contrôles généraux** (dès 2024) **pour prématurés** (né avant 33 sem. et P < 1500g)

Age	Contrôles	Vaccins
1 mois	Contrôle général: poids, alimentation, sommeil, vitamine K	Explication vaccins
2 mois	Contrôle général	DiTePerHibPolio +/- HVB (1) + Pneumo (1) + Rota
3 mois	Vaccin	Meningo B + DiTePerHibPolio (2) +/- HVB + Pneumo (2)
4 mois	Contrôle général	DiTePerHibPolio +/- HVB (3) + Pneumo (3) + Rota
6 mois	Contrôle général, audition	Meningo B
9 mois	Contrôle général	ROR (1) ou ROR-Varicelle (1)
12 mois	Contrôle général, développement	DiTePerHibPolio +/- HVB (3) + Pneumo (3) + Meningo B
15 mois	Contrôle général	ROR (2) ou ROR-Varicelle (2) + Méningo ACWY
24 mois	Contrôle général	-
3 ans	Contrôle général	-
4 - 4 1/2 ans	Contrôle général, vision	DiTePerPolio (4) Rattrapages si nécessaire
6 - 7 ans	Contrôle général, audition	Rattrapage si nécessaire DiTePerPolio (4) / FSME
10 ans	Contrôle général	Rattrapages si nécessaire
11 - 15 ans	Contrôle général	diTePerPolio (5), Méningo ACWY et B, év. varicelle HVB (2 doses) si pas fait, HPV (2-3 doses)

NB : rappel coqueluche recommandé à chaque grossesse + entourage des nourrissons < 6 mois (si dernière dose ≥ 10 ans)

DTPa	diphtérie, tétanos, pertussis (coqueluche)	Méningo ACWY	méningocoques groupes A, C, W, Y
Polio	poliomyélite	Méningo B	méningocoque groupe B
Hib	haemophilus inf. (méningite, épiglottite)	Rota	rotavirus (vaccination orale)
ROR +/- V	rougeole, oreillons, rubéole +/- varicelle	HPV	papillomavirus humain (cancer des organes génitaux)
Pneumo:	pneumocoque (13 sérotypes)	Grippe	virus influenza
HVB:	hépatite virale B	FSME	encéphalite à tiques vernoestivale
Pneumo:	pneumocoque (20 sérotypes ? fin 2024)	RSV	virus respiratoire syncytial (1 <sup>ère</sup> sem. de vie, hiver)

**Programme de vaccination et contrôles généraux** (dès 2024) **pour prématurés** (né avant 33 sem. et P < 1500g)

Age	Contrôles	Vaccins
1 mois	Contrôle général: poids, alimentation, sommeil, vitamine K	Explication vaccins
2 mois	Contrôle général	DiTePerHibPolio +/- HVB (1) + Pneumo (1) + Rota
3 mois	Vaccin uniquement	Meningo B + DiTePerHibPolio (2) +/- HVB + Pneumo (2)
4 mois	Contrôle général	DiTePerHibPolio +/- HVB (3) + Pneumo (3) + Rota
6 mois	Contrôle général, audition	Meningo B
9 mois	Contrôle général	ROR (1) ou ROR-Varicelle (1)
12 mois	Contrôle général, développement	DiTePerHibPolio +/- HVB (3) + Pneumo (3) + Meningo B
15 mois	Contrôle général	ROR (2) ou ROR-Varicelle (2) + Méningo ACWY
24 mois	Contrôle général	-
3 ans	Contrôle général	-
4 - 4 1/2 ans	Contrôle général, vision	DiTePerPolio (4) Rattrapages si nécessaire
6 - 7 ans	Contrôle général, audition	Rattrapage si nécessaire DiTePerPolio (4) / FSME
10 ans	Contrôle général	Rattrapages si nécessaire
11 - 15 ans	Contrôle général	diTePerPolio (5), Méningo ACWY et B, év. varicelle HVB (2 doses) si pas fait, HPV (2-3 doses)

NB : rappel coqueluche recommandé à chaque grossesse + entourage des nourrissons < 6 mois (si dernière dose ≥ 10 ans)

DTPa	diphtérie, tétanos, pertussis (coqueluche)	Méningo ACWY	méningocoques groupes A, C, W, Y
Polio	poliomyélite	Méningo B	méningocoque groupe B
Hib	haemophilus inf. (méningite, épiglottite)	Rota	rotavirus (vaccination orale)
ROR +/- V	rougeole, oreillons, rubéole +/- varicelle	HPV	papillomavirus humain (cancer des organes génitaux)
Pneumo:	pneumocoque (13 sérotypes)	Grippe	virus influenza
HVB:	hépatite virale B	FSME	encéphalite à tiques vernoestivale
Pneumo:	pneumocoque (20 sérotypes ? fin 2024)	RSV	virus respiratoire syncytial (1 <sup>ère</sup> sem. de vie, hiver)